

Национальный календарь профилактических прививок

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Новорожденные в первые 24 часа	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные на 3 — 7 день	Вакцинация против туберкулеза. Проводится щадящей вакциной БЦЖ-М. Для детей из <u>группы риска заражения туберкулеза</u> используется вакцина БЦЖ.
Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
Дети 2 месяца	<ul style="list-style-type: none"> • Первая вакцинация против пневмококковой инфекции • Третья вакцинация против вирусного гепатита В для детей относящихся к <u>группам риска заражения гепатита В</u>
Дети 3 месяца	<ul style="list-style-type: none"> • Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка • Первая вакцинация против полиомиелита (используется инактивированная вакцина) • Первая вакцинация против гемофильной инфекции (вакцинация проводится детям из <u>группы риска заражения гемофильной инфекцией</u>)
Дети 4,5 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> • Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка • Вторая вакцинация против полиомиелита (используется инактивированная вакцина) • Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции • Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (вакцинация проводится детям из <u>группы риска заражения гемофильной инфекцией</u>)
Дети 6 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> • Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка • Третья вакцинация против вирусного гепатита В • Третья вакцинация против полиомиелита (используется живая вакцина, для группы <u>рисказа заражения полиомиелитом</u> — используется инактивированная вакцина) • Третья вакцинация против гемофильной инфекции (вакцинация проводится детям из <u>группы риска заражения гемофильной инфекцией</u>)

Дети 12 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> • Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита • Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (Вакцинация проводится детям, относящимся к <u>группе риска заражения Гепатитом В</u>)
Дети 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 18 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> • Первая ревакцинация против полиомиелита (используется живая вакцина, для группы риска <u>заражения полиомиелитом</u> — используется инактивированная вакцина) • Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка • Ревакцинация против гемофильной инфекции (вакцинация проводится детям, из <u>группы риска заражения гемофильной инфекцией</u>)
Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита (используется живая вакцина, для группы риска <u>заражения полиомиелитом</u> — используется инактивированная вакцина)
Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Дети 6 — 7 лет	<ul style="list-style-type: none"> • Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (проводится анатоксинами с уменьшенным содержанием антигенов) • Ревакцинация против туберкулеза. Проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ).
Дети 14 лет	<ul style="list-style-type: none"> • Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка (проводится анатоксинами с уменьшенным содержанием антигенов) • Третья ревакцинация против полиомиелита (используется живая вакцина, для группы риска <u>заражения полиомиелитом</u> — используется инактивированная вакцина)
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее	Вакцинация против вирусного гепатита В ⁹
Дети от 1 года до 18 лет, Женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не	Вакцинация против краснухи

привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	
Дети от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори	Вакцинация против кори ¹⁰